

Cherry eye

Gašparac Krunoslav
dr. vet. med., univ. dipl. inž. zooteh.

VETERINARSKA AMBULANTA VINKO PRISTOV s.p.
Hraše 20a, 4248 Lesce

Kepica, maltežan, samec, rojen 09.03.2012, m = 3,6 kg

Stranka O. P. je pripeljala v našo ambulanto kužka, ki je imel že 3 dni t.i. stanje cherry eye. Cherry eye lahko klinično opredelimo kot prolapsus žleze tretje veke - žmurke. Izraz je tak, ker prolapsus žleza izgleda kot češnja, ki se nahaja v bližini notranjega kotička očesa. Cherry oko se lahko pojavi pri številnih pasmah psov, vendar je najpogostejša pri mladih buldogih. Čeprav se lahko težava pojavi pri katerikoli starosti, je najpogostejša pri živalih, mlajših od 2 let ter je lahko enostranska ali obojestranska ob prvem pojavu. Čeprav ne poznamo natančnega vzroka nastanka, igra pasma oziroma genetski vpliv odločilno vlogo⁽¹⁾.

VIR:

1. http://www.motherlodebulldogclub.com/cherry_eye.htm

Kepica pred operacijo



Kepica na kontroli čez 1 mesec po operaciji

V literaturi so opisane tri osnovne kirurške tehnike (zasidran orbitalni obroč, sidranje beločnice in nazadnje žepna metoda).

Izbrana metoda je v veliki meri stvar osebne preference. Mi smo uporabili žepno metodo.

Kepica je po operaciji potreboval protibolečinsko zdravilo in antibiotično mazilo za oči, ki se uporablja 2-3 krat na dan za 3 tedne.



Na koncu bi se rad zahvalil lastnici O.P., ker je dovolila objavo slik Kepice na naši internetni strani.

HVALA